

USO AGRICOLA
X-TER RAT BLOQUE
 RODENTICIDA
 BLOQUE PARAFINADO
 REGISTRO: RSCO-RODE-0501-X0001-033-005

COMPOSICION PORCENTUAL:

INGREDIENTE ACTIVO:	% EN PESO
Brodifacoum: 3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4'-bromobifenil-4-il)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftil]	0.005
-4-hidroxycumarina (Equivalente a 0.05 g de i.a./Kg)	
INGREDIENTES INERTES: Atrayentes alimenticios, agentes aversivos, colorantes, Solventes y vehículo.....	99.995
TOTAL	100.00



**NOCIVO EN CASO DE INGESTION
 NOCIVO POR EL CONTACTO CON LA PIEL**

LOTE:
 FABRICACION:
 CADUCIDAD: 2 años a partir de la fecha de fabricación.

TITULAR DEL REGISTRO:
 Syngenta Agro, S.A. de C.V
 Eje 130 # 125
 Col. Zona Industrial del Potosí
 78090 San Luis Potosí, S.L.P.
 Tel: (444) 137 1600

DISTRIBUIDOR:
 RIVAS LABORATORIOS S.A. DE C.V.
 AVE. EL VERGEL # 118
 FRACC. INDUSTRIAL EL VERGEL
 C.P. 38110, CELAYA, GTO.
 TEL: (461) 6149699

**HECHO EN HUNGRÍA
 HECHO EN INGLATERRA**

PRECAUCIÓN



Fecha de elaboración: 17/014/2017	Fecha de Aprobación: 15/06/2017	FO-CAL-08 Hoja Técnica Rev. 00 Fecha: 28/08/2017
---	---	---



“¡ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO!”

“PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO”

Lea cuidadosamente la etiqueta. Los aplicadores y personas que manejan el producto deben usar el equipo de protección adecuado necesario para realizar con seguridad las actividades de manejo, preparación y aplicación del producto (guantes, overol y botas de hule).

“PRECAUCIONES DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO”

- “NO COMA, BEBA O FUME CUANDO ESTÉ UTILIZANDO ESTE PRODUCTO”.
- “NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O FORRAJES”.
- “MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, MUJERES EMBARAZADAS, EN LACTANCIA Y ANIMALES DOMÉSTICOS”.
- “LÁVESE LAS MANOS DESPUÉS DE UTILIZAR EL PRODUCTO Y ANTES DE CONSUMIR ALIMENTOS”.
- “NO USE EL PRODUCTO SIN EL EQUIPO DE PROTECCIÓN ADECUADO”.
- “NO SE INGIERA, INHALE Y EVÍTESE EL CONTACTO CON LOS OJOS Y PIEL”.

“EN CASO DE INTOXICACION, LLEVE AL PACIENTE CON EL MEDICO Y MUESTRELE ESTA ETIQUETA”

PRIMEROS AUXILIOS:

- Retire a la persona intoxicada de la fuente de contaminación, para evitar mayor contacto.
- Consiga atención médica inmediatamente y muéstrela la etiqueta al médico.
- Mantenga al paciente abrigado y en reposo.
- Si ha habido alguna salpicadura en los ojos, lávelos por lo menos 15 minutos con agua corriente.
- Si hubo contacto con la piel, lave cuidadosamente con agua y jabón y quite la ropa impregnada a la persona contaminada.
- Si ha ingerido el producto, **no provoque el vómito.**

RECOMENDACIONES AL MEDICO. Para mayor información en caso de intoxicación llame a:

TELEFONOS DE EMERGENCIA SINTOX 01 800 00 928 00 01 (55) 5598-6659 / 5611-2634 SERVICIO GRATUITO LAS 24 HRS./365 DIAS DEL AÑO

GRUPO QUIMICO: Hidroxicoumarinas.

SINTOMAS DE INTOXICACION:

X-TER RAT Bloques al ser ingerido por seres humanos o por animales, puede reducir la capacidad de coagulación de la sangre y producir hematomas y/o hemorragias.

ANTIDOTO Y TRATAMIENTO ESPECÍFICO:

Administrar vitamina K1. **Dosis adultos:** 40 mg/día en varias tomas. **Dosis niños:** 20 mg/día en varias tomas. El antídoto debe administrarse bajo supervisión médica en forma oral o por inyección intravenosa o intramuscular lenta. Es aconsejable vigilar los tiempos de protombina y niveles de hemoglobina. El paciente debe mantenerse bajo supervisión médica hasta que dichos niveles vuelvan a ser y queden normales y la hemorragia haya cesado.

Fecha de elaboración: 17/014/2017	Fecha de Aprobación: 15/06/2017	FO-CAL-08 Hoja Técnica Rev. 00 Fecha: 28/08/2017
---	---	---



MEDIDAS PARA PROTECCION AL AMBIENTE:

- "DURANTE EL MANEJO DEL PRODUCTO, EVITE LA CONTAMINACIÓN DE SUELOS, RÍOS, LAGUNAS, ARROYOS, PRESAS, CANALES O DEPÓSITOS DE AGUA, NO LAVANDO O VERTIENDO EN ELLOS RESIDUOS DE PLAGUICIDAS O ENVASES VACIOS".
- "MANEJE EL ENVASE VACIO Y LOS RESIDUOS DE PRODUCTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY GENERAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS, SU REGLAMENTO O AL PLAN DE MANEJO DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS, REGISTRADO ANTE LA SEMARNAT".
- "EN CASO DE CAÍDA ACCIDENTAL DEL PRODUCTO, SE DEBERÁ USAR EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, RECUPERAR EL PRODUCTO QUE SEA ÚTIL HASTA DONDE SEA POSIBLE, Y LO DEMÁS RECOGERLO EN UN RECIPIENTE HERMÉTICO Y LLEVARLO AL CENTRO DE ACOPIO DE RESIDUOS PELIGROSOS AUTORIZADO MÁS CERCANO".

"ESTE PRODUCTO ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES TERRESTRES DE SANGRE CALIENTE (MAMÍFEROS Y AVES). ES EXTREMADAMENTE TÓXICO PARA ANIMALES (PECES, INVERTEBRADOS ACUÁTICOS) Y ALGAS".

GARANTIA:

El Productor y el Distribuidor garantizan que el producto es apto para los fines recomendados por la empresa, por lo que se obliga a cubrir al consumidor los gastos razonablemente erogados y a reemplazar el producto defectuoso en el domicilio indicado en la etiqueta, siempre y cuando éste haya sido adquirido en su envase original, protegido por el sello de garantía y dentro del período de caducidad del mismo.

No aplica cuando la efectividad del mismo haya sido influenciada por condiciones climáticas y del suelo, resistencia, técnica de aspersión, se haya utilizado en especies diferentes a las indicadas o por el uso de un método de aplicación distinto al sugerido en las instrucciones. Por lo que no asume responsabilidad alguna por daños o accidentes ocasionados durante su transporte, almacenamiento, manejo, aplicación inadecuada, así como la desviación e interpretación errónea de las instrucciones de uso.

Fecha de elaboración:
17/014/2017

Fecha de Aprobación:
15/06/2017

FO-CAL-08 Hoja Técnica
Rev. 00
Fecha: 28/08/2017



“INSTRUCCIONES DE USO”

CARACTERÍSTICAS:

X-TER RAT BLOQUES, es un rodenticida anticoagulante, activo contra todas las especies de roedores urbanos como son *Rattus norvegicus*, *R. rattus* y *Mus musculus* que causan daño en instalaciones pecuarias. Es activo contra especies de roedores que presentan resistencia a otros anticoagulantes.

RECOMENDACIONES DE USO Y DOSIS EN AREAS PECUARIAS:

1. Limpie el área infestada lo mejor posible.
2. Retire todo material alternativo que sirva como alimento a los roedores.
3. Revise semanalmente los puntos de cebado y reemplazarlos cuando sea necesario.
4. Cuando haya cesado la actividad de los roedores, recoja todo el cebo no consumido y destrúyalo.
5. Conforme aparezcan los roedores muertos, recójalos y entiérrelos lejos de los cultivos comestibles, alimento y de las fuentes de agua.
6. Mantenga algunos puntos de cebo permanentes para evitar reinfestaciones.
7. **X-TER RAT Bloques** no causa recelo al cebo. No es necesario el pre-cebado en el área a tratar.
8. Los roedores mueren de 3 a 8 días después de consumir pequeñas cantidades de producto, dependiendo del estado físico y edad del roedor.
9. Coloque el cebo a los primeros indicios de infestación de roedores y repita la operación a intervalos semanales o más frecuentemente si es necesario.
10. El número y tamaño de los cebaderos a usar dependerá de la severidad de la infestación.
11. Las ratas prefieren alimentarse en sus madrigueras.
12. Los ratones se alimentan esporádicamente y les gusta explorar nuevos objetos y lugares, por lo que es recomendable mover los cebaderos ocasionalmente.
13. Los cebos son consumidos más fácilmente cuando se colocan en las madrigueras. Se debe evitar el acceso de animales domésticos.
14. Es recomendable mover los puntos de cebado ocasionalmente.
15. No aplique en presencia de niños y animales domésticos
16. Se recomienda el uso de **X-TER RAT Bloques** en interiores y proteger el producto de la humedad.

DOSIS RECOMENDADAS:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS Kg/Ha	Recomendaciones
Caña de azúcar, Maíz, Sorgo, Avena, Cebada, Trigo, Arroz (S/L)*	Rata cañera <i>Sigmodon hispidus</i>	1-2	Iniciar aplicaciones cuando se observen las primeras infestaciones y/o se detecten daños al cultivo. El control de roedores es más efectivo y duradero cuando previamente a la aplicación del rodenticida se realiza la correcta evaluación del índice de abundancia y del índice de daño fresco y viejo, programándose adecuadamente las aplicaciones de manera focalizada y uniforme.

()= Intervalo de seguridad: Días que deben de transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

Fecha de elaboración: 17/014/2017	Fecha de Aprobación: 15/06/2017	FO-CAL-08 Hoja Técnica Rev. 00 Fecha: 28/08/2017
---	---	---



*= Aplicación para el grupo botánico

(S/L)= Sin límite.

CONTRAINDICACIONES:

Evite que los niños, animales domésticos y aves se encuentren próximos al producto durante la aplicación o tengan acceso a los cebos, ya que el producto puede causar toxicidad para las especies animales. No use el producto donde los alimentos para consumo humano o animal puedan contaminarse.

No coloque donde los niños, ganado, aves o animales domésticos puedan alcanzarlo, impida su entrada al área tratada después de la aplicación

Fecha de elaboración:
17/014/2017

Fecha de Aprobación:
15/06/2017

FO-CAL-08 Hoja Técnica
Rev. 00
Fecha: 28/08/2017

