

HOJA TÉCNICA

USO DOMÉSTICO
X-TERMIN GEL HORMIGA
INSECTICIDA
CEBO EN GEL
REGISTRO: DOM-INAC-199-323-382-0.030

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”	% en peso
Ingrediente activo: Imidacloprid: (E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolinin-2-ilidenamina	0.03
(Equivalente a 0.3 g de i.a./Kg) Ingredientes inertes: Cebo, amargante y diluyente.	99.97
TOTAL	100.0

Distribuido por:

Titular del registro e Importador: Bayer de México, S.A. de C.V.
Planta y almacén: Vía Morelos No. 330-E,
Sta. Clara Coatitla, Ecatepec de Morelos, Edo. de México, C.P. 55540
Tel.: 01 (55) 5728 3000

Distribuido por: Agroquímicos Rivas S.A. DE C.V.
Carr. Celaya-Salamanca Km. 2, C.P. 38040, Celaya, Gto.
Tel.: 01 (461) 6149699. E-mail: ventas@agroquimicosrivas.com

HECHO EN FRANCIA

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 5



PRECAUCIÓN



Fecha de elaboración:
17/014/2017

Fecha de Aprobación:
15/06/2017

FO-CAL-08 Hoja Técnica
Rev. 00
Fecha: 28/08/2017



“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIA DE USO

Se recomienda utilizar ropa protectora, guantes cubrebocas y gafas protectoras al manipular el producto. No comer, beber, ni fumar al manejar el producto.

Después de la manipulación de este producto se recomienda lavarse con agua y jabón y cambiarse de ropa.

MEDIDAD DE PREVENCIÓN DE DAÑOS A LA SALUD

En caso de exposición crónica al producto o ingestión de grandes cantidades, pueden presentarse síntomas tales como fatiga, debilidad muscular, disturbios respiratorios y hasta calambres musculares. En caso de contacto con los ojos y/o la piel se puede presentar ligera irritación en personas sensibles.

“ANTES DE APLICAR ESTE PRODUCTO PROTEJA LOS ALIMENTOS Y ENSERES DE COCINA”, “NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y ANIMALES DOMESTICOS”.

Guardar y transportar X-TERMIN GEL HORMIGA en su empaque original debidamente cerrado.

“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O JUGUETES”

PRIMEROS AUXILIOS

X-TERMIN GEL HORMIGA es del grupo de los cloronicotinilos. Signos y síntomas de intoxicación: en caso de exposición o ingestión de grandes dosis puede presentarse apatía o impasibilidad, depresión muscular, disturbios respiratorios y tremor muscular, en casos severos se pueden presentar calambres musculares. Este producto puede ocasionar reacciones alérgicas a personas sensibles. **Tratamiento:** Sintomático, se recomienda el lavado gástrico previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado así como laxantes salinos. **Antídoto:** no existe antídoto específico.

“ALEJE A LA PERSONA DEL ARES” “EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS O PIEL, LAVESE CON ABUNDANTE AGUA”.

“EN CASO DE MALESTAR POR SOBREEXPOSICIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”

X-TERMIN GEL HORMIGA es un cebo específico para eliminar hormigas en todos

Fecha de elaboración: 17/014/2017	Fecha de Aprobación: 15/06/2017	FO-CAL-08 Hoja Técnica Rev. 00 Fecha: 28/08/2017
---	---	---



aquellos lugares donde se observa su actividad, por donde circulan y hacen su camino las hormigas. Posee amplio margen de seguridad para su familia y animales domésticos.

Nunca aplique otros insecticidas sobre el producto. El efecto de X-TERMIN GEL HORMIGA puede durar hasta 12 semanas. Siempre y cuando se encuentre presente el cebo. Se deberán renovar los puntos de aplicación tanto como sea necesario hasta que desaparezca la infestación. Recuerde que X-TERMIN GEL HORMIGA tiene que ser consumido por las hormigas. También se puede utilizar como tratamiento preventivo en áreas de hormigas para evitar posibles infestaciones.

MODO DE EMPLEO

- Inspeccione y limpie el área a tratar, para eliminar los factores que favorecen la presencia de hormigas: basura y alimento principalmente.
- Presione la rapa de la jeringa abajo y jale de ella, posteriormente aplique el producto presionando suavemente el embolo de la jeringa. Al finalizar la aplicación, vuelva a colocar la tapa.
- Aplique una gota de producto por cada metro a lo largo del recorrido de las hormigas, una gota por m² del área a tratar. Ejemplo: en una cocina de 10 m² aplicar 10 gotas de producto distribuidas en lugares estratégicos de la cocina, como pueden ser: grietas y esquinas de paredes, entre los mosaicos, marcos de ventanas, rincones, cerca de grietas y hendiduras, bajo los muebles, debajo y atrás de equipos eléctricos y electrónicos.

La mayor actividad del producto se logra cuando la aplicación se realiza a lo largo del trayecto de las hormigas. En caso de una gran infestación, se deberá aplicar un mayor número de gotas, logrando así una mayor disposición del producto para las hormigas.

Fecha de elaboración:
17/014/2017

Fecha de Aprobación:
15/06/2017

FO-CAL-08 Hoja Técnica
Rev. 00
Fecha: 28/08/2017

