

USO DOMÉSTICO  
**X-TERMIN GEL CUCARACHA**  
INSECTICIDA  
CEBO EN GEL  
REGISTRO: RSCO-DOM-INAC-199-321-382-02

COMPOSICIÓN PORCENTUAL

“COMPOSICIÓN PORCENTUAL”	% en peso
<b>Ingrediente activo:</b> <b>Imidacloprid:</b> (E)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-N-nitroimidazolinin-2-ilidenamina	2.15
(Equivalente a 21.5 g de i.a./Kg) <b>Ingredientes inertes:</b> Alimento cebo, anticongelante, espesantes, neutralizante, emulsionantes, dispersante, antiespumante, conservadores y disolvente.	97.85
<b>TOTAL</b>	<b>100.0</b>

**Distribuido por:**

**Titular del registro e Importador:**

Bayer de México, S.A. de C.V.  
Planta y almacén: Vía Morelos No. 330-E,  
Sta. Clara Coatitla, Ecatepec de Morelos, Edo. de México, C.P. 55540  
Tel.: 01 (55) 5728 3000

**Distribuido por:**

Agroquímicos Rivas S.A. DE C.V.  
Carr. Celaya-Salamanca Km. 2, C.P. 38040, Celaya, Gto.  
Tel.: 01 (461) 6149699. E-mail: ventas@agroquimicosrivas.com

**HECHO EN FRANCIA**

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA 5



**PRECAUCIÓN**



**Fecha de elaboración:**  
17/014/2017

**Fecha de Aprobación:**  
15/06/2017

**FO-CAL-08** Hoja Técnica  
**Rev. 00**  
**Fecha:** 28/08/2017



**“ALTO, LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:** Se recomienda utilizar ropa protectora, guantes, cubre bocas y gafas protectoras al manipular el producto. No comer, beber, ni fumar al manejar el producto. Después de la manipulación de este producto se recomienda lavarse con agua y jabón y cambiarse de ropa.

**MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE DAÑOS A LA SALUD:** En caso de exposición crónica al producto o ingestión de grandes cantidades, pueden presentarse síntomas tales como fatiga, debilidad muscular, disturbios respiratorios y hasta calambres musculares. En caso de contacto con los ojos y/o la piel se puede presentar ligera irritación en personas sensibles.

**“ANTES DE APLICAR ESTE PRODUCTO PROTEJA LOS ALIMENTOS Y ENSERES DE COCINA”,  
“NO SE APLIQUE EN PRESENCIA DE PERSONAS Y ANIMALES DOMESTICOS”.  
“NO SE REUTILICE ESTE ENVASE”,  
“EVITASE EL CONTACTO CON LOS OJOS”.**

Guardar y transportar X-TERMIN GEL CUCARACHA en su empaque original debidamente cerrado.

**“NO SE TRANSPORTE NI ALMACENE JUNTO A PRODUCTOS ALIMENTICIOS, ROPA O JUGUETES”.**

**PRIMEROS AUXILIOS:** X-TERMIN GEL CUCARACHA es del grupo químico de los cloronicotinilos. Signos y síntomas de intoxicación: en caso de exposición o ingestión de grandes dosis pueden presentarse apatía o impasibilidad, depresión muscular, disturbios respiratorios y tremor muscular, en casos severos se pueden presentar calambres musculares. Este producto puede ocasionar reacciones alérgicas a personas sensibles.

Tratamiento: sintomático, se recomienda el lavado gástrico previa aspiración del contenido estomacal y la administración posterior de carbón activado así como laxantes salinos. Antídoto: no existe antídoto específico.

**“ALEJE A LA PERSONA DEL AREA”. “EN CASO DE CONTACTO CON OJOS O PIEL, LAVESE CON ABUNDANTE AGUA”. “EN CASO DE MALESTAR POR SOBREEXPOSICIÓN LLEVE AL PACIENTE CON EL MÉDICO Y MUÉSTRELE ESTA ETIQUETA”.**

<b>Fecha de elaboración:</b> 17/014/2017	<b>Fecha de Aprobación:</b> 15/06/2017	<b>FO-CAL-08</b> Hoja Técnica <b>Rev. 00</b> <b>Fecha:</b> 28/08/2017
---	---	---



**FORMA ADECUADA DE USO X-TERMIN GEL CUCARACHA** es un cebo específico para eliminar cucarachas en todos aquellos lugares donde se observa su actividad y por donde circulan y pasan las cucarachas. Posee amplio margen de seguridad para su familia y animales domésticos.

**HOJA TÉCNICA:** Nunca aplique otros insecticidas sobre el producto.

El efecto de X-TERMIN GEL CUCARACHA puede durar hasta 12 semanas, siempre y cuando se encuentre presente el cebo. Se deberán renovar los puntos de aplicación tanto como sea necesario hasta que desaparezca la infestación. Recuerde que X-TERMIN GEL CUCARACHA tiene que ser consumido por las cucarachas. También se puede utilizar como tratamiento preventivo en áreas libres de cucarachas para evitar posibles infestaciones.

### **MODO DE EMPLEO**

- Inspeccione y limpie el área a tratar, para eliminar los factores que favorecen la presencia de cucarachas: basura y alimento principalmente.
- Presione la tapa de la jeringa hacia abajo y jale de ella, posteriormente aplique el producto presionando suavemente el émbolo de la jeringa. Al finalizar la aplicación, vuelva a colocar la tapa.
- Aplique de 1 a 3 gotas de producto por cada m<sup>2</sup> largo del recorrido de las cucarachas o una gota por m<sup>2</sup> del área a tratar del producto, distribuidas en lugares estratégicos de la cocina, como pueden ser: grietas y esquinas de paredes, entre los mosaicos, marcos de ventanas, rincones, cerca de grietas y hendiduras, bajo los muebles, estufas, refrigeradores, debajo y atrás de equipos eléctricos y electrónicos. La mayor actividad del producto se logra cuando la aplicación se realiza a lo largo del trayecto de las cucarachas. En caso de una gran infestación, se deberá aplicar un mayor número de gotas, logrando así una mayor disposición del producto para las cucarachas.

**Fecha de elaboración:**  
17/014/2017

**Fecha de Aprobación:**  
15/06/2017

**FO-CAL-08** Hoja Técnica  
**Rev. 00**  
**Fecha:** 28/08/2017

